

CHĂM DỨT LẠM DỤNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH KHÔNG ĐÚNG CÁCH. CHỐNG KHÁNG THUỐC



Kháng kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn và các vi sinh vật khác biến đổi sau khi phơi nhiễm với thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh là một trong các loại thuốc kháng vi khuẩn phổ biến nhất được sử dụng trên người và động vật. Sử dụng thuốc kháng sinh quá mức và không đúng cách đang làm gia tăng tình trạng kháng thuốc và gây ra nhiều nguy cơ cho tất cả chúng ta.

Kháng kháng sinh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai ở bất cứ lứa tuổi nào tại bất cứ quốc gia nào. Đó là mối đe dọa với sức khỏe con người, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ?

- 1 Chỉ dùng kháng sinh khi có đơn thuốc của bác sĩ.
- 2 Không dùng thuốc kháng sinh thừa từ lần sử dụng trước hoặc không chia sẻ, dùng chung thuốc kháng sinh của mình cho người khác.
- 3 Phòng chống nhiễm khuẩn bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và giữ cho cơ thể khỏe mạnh.



Food and Agriculture Organization of the United Nations



World Health Organization

Western Pacific Region

CHẤM DỨT LẠM DỤNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH KHÔNG ĐÚNG CÁCH. CHỐNG KHÁNG THUỐC



Kháng kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn và các vi sinh vật khác biến đổi sau khi phơi nhiễm với thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh là một trong các loại thuốc kháng vi khuẩn phổ biến nhất được sử dụng trên người và động vật. Sử dụng thuốc kháng sinh quá mức và không đúng cách đang làm gia tăng tình trạng kháng thuốc và gây ra nhiều nguy cơ cho tất cả chúng ta.

Kháng kháng sinh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai ở bất cứ lứa tuổi nào tại bất cứ quốc gia nào. Đó là mối đe dọa với sức khỏe con người, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

CHÍNH PHỦ CÓ THỂ LÀM GÌ

Bao gồm nhà hoạch định chính sách, người đứng đầu các Bộ và các cơ quan quản lý



- 1 Chấm dứt sử dụng quá mức và sai mục đích thuốc kháng sinh bằng cách:**
 - > Ủng hộ kế hoạch hành động quốc gia đa ngành về kháng kháng sinh
 - > Xây dựng và thực thi các quy định nhằm chấm dứt việc sử dụng quá mức và sai mục đích (lạm dụng) thuốc kháng sinh ở người và động vật
 - > Phổ biến thông tin về cách chấm dứt việc sử dụng quá mức và sai mục đích thuốc kháng sinh có sẵn cho người dân
- 2 Xây dựng và thực thi các quy định nhằm ngăn ngừa sự lây truyền nhiễm khuẩn thông qua:**
 - > Giám sát sự tuân thủ của các bệnh viện và phòng khám theo các tiêu chuẩn phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn
 - > Thực thi các thông lệ tốt về sản xuất nông nghiệp và thực phẩm
 - > Đảm bảo các cộng đồng được tiếp cận nước an toàn và điều kiện vệ sinh



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



World Health
Organization

Western Pacific Region

CHẤM DỨT LẠM DỤNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH KHÔNG ĐÚNG CÁCH. CHỐNG KHÁNG THUỐC




Kháng kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn và các vi sinh vật khác biến đổi sau khi phơi nhiễm với thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh là một trong các loại thuốc kháng vi khuẩn phổ biến nhất được sử dụng trên người và động vật. Sử dụng thuốc kháng sinh quá mức và không đúng cách đang làm gia tăng tình trạng kháng thuốc và gây ra nhiều nguy cơ cho tất cả chúng ta.

Kháng kháng sinh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai ở bất cứ lứa tuổi nào tại bất cứ quốc gia nào. Đó là mối đe dọa với sức khỏe con người, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

BÁC SĨ THÚ Y VÀ CHUYÊN GIA SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT CÓ THỂ LÀM GÌ

- 1 Chấm dứt sử dụng quá mức và sai mục đích thuốc kháng sinh bằng cách:**
 - > Kê đơn và sử dụng thuốc kháng sinh cho động vật dưới sự giám sát của bản thân và chỉ khi cần thiết
 - > Lựa chọn thuốc kháng sinh hợp lý thông qua chẩn đoán chính xác
 - > Giáo dục chủ vật nuôi về nguy cơ kháng kháng sinh
- 2 Ngăn ngừa sự lây truyền nhiễm khuẩn bằng cách:**
 - > Đảm bảo bàn tay, dụng cụ và môi trường luôn sạch
 - > Tiêm phòng cho động vật và cách ly động vật mắc bệnh để phòng ngừa lây bệnh
 - > Tuyên truyền các thông lệ tốt cho người nông dân và chủ vật nuôi khác bao gồm vấn đề vệ sinh



Food and Agriculture Organization of the United Nations



World Health Organization
Western Pacific Region

CHĂM DỨT LẠM DỤNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH KHÔNG ĐÚNG CÁCH. CHỐNG KHÁNG THUỐC



Kháng kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn và các vi sinh vật khác biến đổi sau khi phơi nhiễm với thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh là một trong các loại thuốc kháng vi khuẩn phổ biến nhất được sử dụng trên người và động vật. Sử dụng thuốc kháng sinh quá mức và không đúng cách đang làm gia tăng tình trạng kháng thuốc và gây ra nhiều nguy cơ cho tất cả chúng ta.


Việc lạm dụng thuốc kháng sinh trên gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng là yếu tố chính góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh và sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc lên người thông qua môi trường chuỗi thực phẩm

NHÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CÓ THỂ LÀM GÌ?

Bao gồm người chăn nuôi gia súc, gia cầm, người nuôi trồng thủy sản và cây trồng.

1 Chăm dứt sử dụng quá mức và sai mục đích thuốc kháng sinh bằng cách:

- > Đảm bảo chỉ sử dụng thuốc kháng sinh trên động vật dưới sự giám sát của bác sỹ thú y
- > Không bao giờ sử dụng thuốc kháng sinh để kích thích tăng trưởng
- > Nâng cao hiểu biết về nguy cơ của việc sử dụng quá mức và sai mục đích thuốc kháng sinh



2 Ngăn ngừa sự lây truyền nhiễm khuẩn bằng cách:

- > Áp dụng các thông lệ tốt tại tất cả các bước sản xuất thực phẩm
- > Nuôi động vật trong điều kiện sạch sẽ và vệ sinh và tránh mật độ quá cao
- > Tiêm phòng cho động vật và cách ly động vật mắc bệnh để phòng ngừa lây bệnh



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



World Health
Organization
Western Pacific Region

CHẤM DỨT LẠM DỤNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH KHÔNG ĐÚNG CÁCH. CHỐNG KHÁNG THUỐC



Kháng kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn và các vi sinh vật khác biến đổi sau khi phơi nhiễm với thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh là một trong các loại thuốc kháng vi khuẩn phổ biến nhất được sử dụng trên người và động vật. Sử dụng thuốc kháng sinh quá mức và không đúng cách đang làm gia tăng tình trạng kháng thuốc và gây ra nhiều nguy cơ cho tất cả chúng ta.

Kháng kháng sinh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai ở bất cứ lứa tuổi nào tại bất cứ quốc gia nào. Đó là mối đe dọa với sức khỏe con người, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

CÁN BỘ Y TẾ NÊN LÀM GÌ

Bác sĩ, Điều dưỡng, Nha sĩ, Dược sĩ

- 1 Chấm dứt sử dụng quá mức và sai mục đích thuốc kháng sinh bằng cách:**
 - > Chỉ kê đơn và phát thuốc kháng sinh khi cần thiết và theo hướng dẫn hiện hành
 - > Giáo dục bệnh nhân về cách sử dụng thuốc kháng sinh và sự nguy hiểm của việc lạm dụng thuốc kháng sinh
 - > Tiêu hủy đúng cách thuốc kháng sinh hết hạn và chưa sử dụng
- 2 Ngăn ngừa sự lây truyền nhiễm khuẩn bằng cách:**
 - > Thực hiện tiêm chủng cho bệnh nhân đúng thời hạn
 - > Đảm bảo bàn tay, dụng cụ và môi trường luôn sạch
 - > Phối hợp với các cán bộ khác để tăng cường phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn



Food and Agriculture Organization of the United Nations



World Health Organization
Western Pacific Region